




PRODIVET Pharmaceuticals

termékkatalógus 2019 / 1



DRPG KFT

FORGALMAZÓ

1036 Budapest
Kolosy tér 1/A

tel: 06-30-461-09-37 | www.drpg.eu



Állatgyógyászati készítmények



Kiegészítő takarmány



Ápoló termékek

Prodivet Pharmaceuticals

Szakértő az állategészségügyben, különféle tanulmányokon alapuló, kifinomult termékeivel kis és haszonállatok számára tűnik ki a gyártók közül.

- kiváló minőségű termékek és nyersanyagok
- megfelelő ellenőrzések



takarmánykiegészítők haszonállatok számára



takarmánykiegészítők társállatok számára



innovatív ápolószerek

Tartalom



TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐK

ALDONAL nM[®]
APLAZYL[®]
EFAZAN DOG[®]
EQUANOL M
FERMENT 2.0
FORTILAC
LACTIGEST
RODAC premium



ÁPOLÓSZEREK

ALUBAN
AURIPHYT[®]
CHENIDINE[®]
LOCTAL-S
PRODIMASTIN
PRODIPLAST-T
SEBODEX



ALDONAL nM®

DIÉTÁS TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ HASMENÉS VESZÉLYE ESETÉN

- a víz és az elektrolit egyensúlyának stabilizálása érdekében.
- optimális koncentrációban tartalmaz lúgosító összetevőket és bél nyálkahártya védelmező anyagokat.

Összetétel: Laktóz, nátrium-hidrogén-karbonát, nátrium-klorid, kálium-klorid, magnézium-karbonát, élesztő és élesztő alkotóelemei, csillagánizs.

Kiszerezés: 1 Doboz 12 tasak, 100 g

Adagolás: Borjú és csikó: oldja fel a tasak tartalmát (100 g) 1,5 liter langyos vízben és keverje össze.
Malac, gida és bárány: oldjunk fel 20 g-ot 30 cl langyos vízben és keverjük össze. Adjuk be az elkészített oldatot legalább naponta kétszer, 1-7 napon át

FORTILAC

TEJPÓTLÓ TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ BORJAK ÉS MALACOK SZÁMÁRA.

- jó ízű és étvágygerjesztő hatású
- könnyen emészthető
- összetevői különböző természetes étel-alapanyagokból és vitaminokból állnak, hogy kiegyensúlyozott táplálást biztosítsanak

Összetétel: növényi zsírok, élesztő Diamond V xpc 2000 mg-ig, szorbit, magnézium-sztearát, cink, réz, jód, kobalt, E-vitamin.

Kiszerezés: 1 Doboz 10 tasak 100 g

Adagolás: Oldjuk fel egy tasak tartalmát 0,5 l hideg vízben, majd adjunk hozzá körülbelül 1 l forró vizet.
Borjú: egy tasak, naponta kétszer.
Malacok: ¼ tasak, naponta kétszer

LACTIGEST

FOLYÉKONY TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ, NAGY EMÉSZTHETŐSÉGGEL BORJAK ÉS MALACOK RÉSZÉRE

- támogatja a bélrendszert, puffadás esetén alkalmazandó.
- A LACTIGEST-et a tejjel való etetés után kell alkalmazni.
- könnyen emészthető
- A LACTIGEST-t „tisztá” formában, közvetlenül a szájba kell beadni, közvetlenül a táplálás után

Összetétel: szorbitol - pektin - zselatin

Kiszerezés: flakon 250 ml és 1L

Adagolás: Borjak: 60 ml (3-4 evőkanál) naponta kétszer
Malacok: 5 ml (1 kávéskanál) naponta kétszer-háromszor vízben vagy tejben



EQUANOL M

DIÉTÁS TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ BORJAK SZÁMÁRA. HASMENÉS VESZÉLYE ESETÉN

- a víz- és elektrolit-egyensúly stabilizálása érdekében.
- serkenti az emésztést a tejsavas erjesztéssel és támogatja többek között a nátrium szállítását glükózon keresztül.
- szájon át adható rehidrációs oldat (ORS), amely alapvető elektrolitokban gazdag és kompatibilis a tejjel táplálással.

Összetétel: Dextróz, kukoricakeményítő, nátrium-klorid, nátrium-karbonát, kálium-klorid, magnézium-karbonát, csillagánizs.

Kiszerezés: 1 Doboz 12 tasak, 42 g

Adagolás: borjak: oldja fel a tasak tartalmát (42 g) 1 l langyos vízben és keverje össze.

Adja be a feloldott ORS-t, naponta egyszer-kétszer, 1-7 napon át.

FERMENT 2.0

DIÉTÁS TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ BORJAK SZÁMÁRA. HASMENÉS VESZÉLYE ESETÉN

- Pro- és prebiotikumok a borjú emésztőrendszerének pH-jához igazítva.
- Emésztési zavarok veszélye esetén, azok tartama alatt vagy azokból való lábadozáskor.

Összetétel: Dextróz, frukto-oligoszacharidok, élesztő, élesztőtermékek és kukoricakeményítő. Bélflóra-stabilizátorok: Enterococcus faecium + Lactobacillus rhamnosus

Kiszerezés: 250 g flakon és 1400 g vödör

Adagolás: Borjú: 15 g (2 kanál) por reggel és este, 4 héten át. A por keverhető vízbe, takarmányba, a kolosztrumba vagy tejbe is.

RODAC premium

DIÉTÁS TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ TEJELŐ TEHENEK SZÁMÁRA. ELLÉSI BÉNULÁS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

- Magas kalcium - (Ca = 59 g) és foszfortartalom (P = 45 g) biológiailag magasaszasztható foszfor / kalcium sók formájában.
- Irritáló kalcium-klorid nélkül.
- Optimális összetétel a Ca / P arány adaptálására a takarmányadagban,
- közvetlenül az ellés előtt vagy után, különösen a magas termelésű tejelő teheneknél.
- Ne használja tetraciklineket tartalmazó szájon át adandó készítményekkel, illetve az emésztőrendszer elzáródása esetén.

Összetétel: dikalcium-foszfát és dinátrium-foszfát

Kiszerezés: flakon 500 ml

Adagolás: 1 üveg 12 óránként, kezdje az ellés első jeleitől az azt követő 2 nappal. Használat előtt alaposan rázza fel.

APLAZYL®

FONTOS TUDNIVALÓK APLAZYLRŐL ÍZÜLETEK - MOBILITÁS – RUGALMASÁG

- támogatja az ízületek egészségét és optimális működését.
- természetes alkotóelemeinek köszönhetően táplálja, keni és óvja a porcot.
- támogatja az állat kényelmét mozgása közben.

Tömjénfa – (*Boswellia serrata*)

A tömjénfa elősegíti az ízületek rugalmasságát és csökkenti az ízületi merevséget.

Zöld ajkú kagyló – (*Perna canaliculus*)

A zöld ajkú kagyló gazdag a következő természetes összetevőkben: glikozaminoglikánok, aminosavak, esszenciális omega-3 zsírsavak, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek.

Zöld alga – (*Chlorella pyrenoidosa*)

A Zöld alga nagyon gazdag esszenciális omega-3 zsírsavakban, vitaminokban, ásványi anyagokban és nyomelemekben. Erős antioxidáns hatású.

Ördögkarom – (*Harpagophytum procumbens*)

Ördögkarom jól ismert fájdalomcsillapító hatásáról.

Csalán – (*Urtica urens*)

A csalán tisztítja az ízületeket, antioxidáns hatással rendelkezik

Kondroitin-szulfát

A kondroitin a porc természetes alkotóeleme, amely az ízületeket keni.

Glükózamin-szulfát

A porcok és a szinoviális folyadék legfontosabb összetevője.

Mangán

A mangán nélkülözhetetlen nyomelem az anyagcseréhez. Együttműködik a kondroitinnal és a glükózaminnal, melyek a porcszövet felépítéséhez szükségesek.

Halolaj

A halolaj zsírsavakat (omega-3) biztosít, amelyek megvédik az ízületeket.

100% természetes eredetű összetevők

APLAZYL® nem csak a glükózamint és a kondroitint tartalmaz.

Az összes alkotóelem 100% -ban természetes eredetű, védi és támogatja a porcokat és a szinovia termelését.

Kifejezetten négylábú barátod ízületeire fejlesztették ki

APLAZYL® fenntartja az ízületek rugalmasságát, keni azokat és biztosítja az izom-csontrendszer táplálkozási igényeit az intenzív erőfeszítések ideje alatt.

Teljes értékű és kiegyensúlyozott étrend

Az egészséges és adaptált étrend elengedhetetlen az állat jólétéhez. Különösen a nagy és az extra nagy kutyafajták kölyökkutyáit kell gondosan táplálni.

Az APLAZYL® különösen ajánlott, mivel biztosítja az összes alapvető elemet az egészséges és erős ízületekhez.

Buboréksomagolás

APLAZYL® tableta buboréksomagolásban kerül kiszérésre az aktív komponensek jobb megőrzése érdekében.



APLAZYL®



TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ MOBILITÁS = ÉLETMINŐSÉG

- támogatja a mozgásszervi funkciókat és egészségesen tartja az ízületeket.
- rendkívül intenzív ízületvédő hatású, támogatja és erősíti a porcokat, elősegíti azok regenerálódását, növeli a kötőszövet erejét és rugalmasságát.
- kielégíti a mozgásszerv megnövekedett táplálkozási igényeit a növekedés és az intenzív erőfeszítések ideje alatt, és fenntartja az ízületek rugalmasságát.
- idős kutyáknál, táplálékkiegészítésként kölyökkutyáknál, életük első évében
- mozgásszervi betegségek, műtétek utáni lábadozási időszakban, orvosi, gyógyszeres kezelések mellett, intenzív terhelés előtt, közben és utána, versenyre való felkészítés folyamán, táplálékkiegészítésként a vemhesség és szoptatás ideje alatt.

Összetétel:	Új-zélandi zöldkagyló (<i>Perna canaliculus</i>), 2KCI glükózamin-szulfát, kondroitin-szulfát (csirke), Zöld alga por (<i>Chlorella pyrenoidosa</i>), halolaj, magnézium-sztearát és a gyógynövények feldolgozásából származó termékek: csalán (<i>Urtica dioica</i>).
Kiszérés:	A doboz 60, 120, 300 vagy 600 osztható tablettát tartalmaz, buboréksomagolásban, 1.700 mg
Adagolás:	Szájon át történő alkalmazás, eleségbe keverve vagy közvetlenül a szájba. Kutya: 1 tableta 10 kg testsúlyra, naponta. Macska: ½ tableta, naponta egyszer. Szedése kúraszerűen legalább 1 hónapig ajánlott, szükség esetén meghosszabbítható.

Adalékanyagok/kg:

aminosavak mangán kelátja, hidrát (3b504) mangán	2 000 mg
tömjénfa (<i>Boswellia serrata</i>)	44.000 mg
ördögkarom (<i>Harpagophytum procumbens</i>)	12.000 mg

EFAZAN® DOG



TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ BŐRFUNKCIÓ ERŐSÍTÉSE DERMATÓZIS ÉS ERŐS SZŐRHULLÁS ESETÉN.

- Ajánlott a bőr minőségének romlása esetén: zsíros, száraz, pikkelyes vagy kellemetlen szagú bőr, megnövekedett igénybevétel esetén: Intenzív terhelés előtt, versenyre való felkészítés folyamán, kiállítás kutyák, sport, vagy idős kutyák esetében
- Magas koncentrációban tartalmaz esszenciális zsírsavakat (EFA), cinket és E-vitamint

Összetétel:	Finomított növényi borágó olaj, szarvasmarhafélék zselatin, halolaj, finomított növényi kankalinolaj, napraforgó préselvény, glicerin és lenmag préselvény
Kiszérés:	Dobozonként 45 kapszula buboréksomagolásban
Adagolás:	Kutya: 1 kapszula/ 10 ttkg , naponta egyszer, 6 héten át – legfeljebb 2 hónapig. Alkalmazható vemhes és szoptató szukáknál is.

E-vitamin (D- α -tokoferol) (3a700)	13.000 mg
--	-----------

ALUBAN SPRAY



Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. A tartály nyomás alatt van.

ÁLLATGYÓGYÁSZATI ÁPOLÓSZER A BŐR VÉDELMEBEN

- Alkalmazható az állatok sebeinek, sérüléseinek befedésére, a szennyeződéstől való megóvására.
- Az alkalmazás helyén védő bevonatot képez.
- Nem alkalmazható az összetevőkkel szembeni túlérzékenység esetén.

Összetétel: Mikronizált alumínium por 1-3%, paraffin olaj
Propán, bután, ciklopentán

Kiszerezés: 200 ml-es alumínium palack
Külsőleg alkalmazandó.
Használat előtt alaposan felrázandó.
Az Aluban sprayt a megtisztított és száraz bőrre kell alkalmazni kb. 20 cm távolságból.

Adagolás:



AURIPHYT fültisztító olaj

ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYHATÁSÚ TERMÉK

- A külső hallójárat tisztítására, a fülváladék eltávolítására,
- kipirult, érzékeny, viszkető fül kiegészítő kezelésére

Összetétel: Triisostearin PEG-6 esters, Ehtoxydiglycol, Melaleuca alternifolia oil, Squalane, Lavandula latifolia oil, Commifora myrrha oil, Thymus vulgaris oil, Matricaria recutita oil, Menthol, Tocopherol, Lomonene, Linalool, Coumarin

Kiszerezés: 24 ml üvegben, pumpával, kartondobozban

Adagolás: Nagyobb mennyiségű váladék vagy kipirult fül esetén 1-3 pumpálás mindkét fülbe naponta kétszer. Panaszmentes, de hosszú, lógó fülű vagy beszükkült hallójáratú rendelkező állatoknak 1-3 pumpálás fülenként heti 1-2 alkalommal. Alkalmazás után a fültövek enyhe átmasszírozása javasolt.

CHENIDINE® hidroaktív gél

ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYHATÁSÚ TERMÉK

- A bőr regenerációját támogató gél.

Összetétel: Aqua, Alcohol denat., Polysorbate 20, Phenoxyethanol, Glycerin, Polysorbutene, Sorbitol, Plankton extract, Borago officinalis seed oil, Tocopheryl acetate, Polyacrylate-13, Propylene glycol, Centella asiatica extract, Ethylhexylglycerin, Lactic acid, Ascorbic acid, Lavandula angustifolia oil, Melaleuca alternifolia oil, Thymus vulgaris oil.

Kiszerezés: 20 g-os/100 g-os alumínium tubus

Adagolás: Külsőleg alkalmazandó. Alkalmazása előtt az alkalmazni kívánt területet tisztítsa meg, szükség esetén nyírja le a szőrt. Ezt követően vékonyan kenje be a területet. Ne fedje le. Naponta kétszer alkalmazandó.



PRODIMASTIN gél

ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYHATÁSÚ TERMÉK IZMOK, INAK ÉS TÖGYSZÖVET

- Melegítő hatású gél, mely támogatja az izmok, inak és a tőgyszövet regenerációját, a szövetek rugalmasságát.
- Alkalmazható merev, fájó izmok, fáradt inak esetében.
- Elősegíti, hogy a tőgy puha és rugalmas maradjon.

Összetétel: AQUA – CAMPHOR – PROPYLENE GLYCOL – ISOPROPYL ALCOHOL – METHYL SALICYLATE – CARBOMER – TRIETHANOLAMINE – CETEARETH-20 – BENZISOTHIAZOLINONE – METHYLISOTHIAZOLINONE – CI 42051 – CI 47005 – SODIUM CHLORIDE – SODIUM SULFATE

Kiszerezés: 500 g, 1000 g műanyag dobozban.

Adagolás: Külsőleg alkalmazandó. Alkalmazás előtt az alkalmazás helyét meg kell tisztítani és szárítani, majd megfelelő mennyiségű géllal be kell masszírozni a területet, amíg vékony filmréteg alakul ki. Naponta egyszer vagy kétszer alkalmazandó. Alkalmazás előtt kérje állatorvosa tanácsát..



LOCTAL-S gél

ÁLLATGYÓGYÁSZATI SEGÉDANYAG SÍKOSÍTÓ ÉS MAGZATVÍZPÓTLÓ GÉL

- Síkosító és magzatvízpótló gél

Összetétel: Felületaktív anyagok, síkosító, tartósítószer, víz (95%)

Kiszerezés: 1 kg műanyag palackban

Adagolás: Külsőleg alkalmazandó. Rektális vagy vaginális vizsgálathoz kis mennyiséget tegyen a kezére vagy a műszerre a Loctal-S gélből. Kevés víz hozzáadásával növelhető a síkosító hatás. Magzatvíz pótláshoz a terméket keverje jól össze 1:5-1:10 arányban vízzel.

PRODIPLAST-T spray

ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYHATÁSÚ TERMÉK PATÁK ÉS BŐRVÉDELEM

- Kétszer desztillált növényi kátrányt tartalmazó spray bőrre és patára.
- Védi és erősíti a sérült patát. Védi a szennyezésnek kitett bőrt, szárító hatású.
- Macskákra nem alkalmazható!

Összetétel: Hatóanyag: fakátrány
Segédanyagok: Aceton, Propan-2-ol, Propán, Bután, Butanon

Kiszerezés: 1 kg műanyag palackban

Adagolás: Külsőleg alkalmazandó. Használat előtt alaposan felrázandó. Fújja be az érintett területet kb. 15-30 cm távolságból.



SEBODEX sampon

ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYHATÁSÚ TERMÉK. FAGGYÚTERMELÉST SZABÁLYOZÓ SAMPON



- Mélyen tisztítja a bőrt és az állat bundáját, biztosítja a bőr megfelelő hidratáltságát.
- Bakteriális bőrgyulladások kiegészítő kezelésére alkalmazható.

Összetétel: aqua, sodium laureth sulfate, benzoyl peroxide, parfum, sodium chloride, propylene glycol, cocamide mea, carbomer, sodium hydroxyde, sodium benzoate, sodium dehydroacetate. allergén összetevők "parfúm": d-limonene, citral, linalool, citronellol, amyl cinnamal, geraniol.

Kiszerezés: 200 ml-es flakon

Adagolás: Külsőleg alkalmazandó. Használat előtt alaposan felrázandó. A bőr állapotának megfelelően hetente 1-3-szor alkalmazza. Nedvesítse be az állat bundáját, majd masszírozza bele a sampont, amíg nem habzik. Várjon 10 percet, majd jól öblítse le. Macskáknál csak helyileg alkalmazza.